



Cestral *Plus* närimistablett

prasikvanteel/püranteel/fenbendasool

Tõhus ja maitsev

- Tõhus sagedamini esinevate koerte sooleparasiitide vastu
- Rutiinseks ussitõrjeks piisab ühekordsest annustamisest
- 92% koertest sööb tabletti vabatahtlikult**

Ussitõrje reeglid!

- Tehke oma lemmikule regulaarset ussitõrjet, vastavalt oma loomaarsti antud juhistele.
- Ravimi täpseks doseerimiseks kaaluge oma lemmikut.
- Ideaalis, peaksid kutsikad saama ussirohtu 2 nädala vanuselt, edaspidi iga 2 nädala järel ja 2 nädalat pärast võõrutamist. Seejärel iga 4 nädala järel kuni pooleaastaseks saamiseni.
- Täiskasvanud koerte ussitõrje sagedus sõltub elukeskkonnast, toidust ja elustiilist. Nakatumisrisk on suurem koertel, kes elavad aias, liiguvad looduses, kipuvad sööma raipeid või rooja ning joovad lompidest.
- Tiinetele emastele on soovitatav teha ussitõrjet 10 päeva enne poegimist ja seejärel koos kutsikatega.
- Ussitõrjet on soovitatav teha üheaegselt kõikidele pere lemmikutele.

Küsige lisainformatsiooni oma loomaarstilt!

Parasiidid? Kindlasti mitte!

Meie kasutame Cestral *Plus* i

prasikvanteel/püranteel/fenbendasool



Väga hea maitsega!



Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru,
Uusaru 5, Saue Tasuta klienditoe telefon:
800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee



Ravimireklaam! Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu loomaarsti või apteekriga. Ainult veterinaarseks kasutamiseks.



Miks ma peaksin oma lemmikule andma ussirohtu?

Koerte parasiidinakkus jääb sageli märkamatuks. Hoolimata sellest, levitab nakatunud koer regulaarselt parasiite – ja nende mune, olles seeläbi nakkusallikaks teistele lemmikutele ja isegi Teile endale. Eriti ohustatud on väikelapsed, kes ei ole enesehügieenist kuigi teadlikud. Seega koera ravimine on inimeste haigestumise vältimine.


Kõige tavalisemad sooleparasiidid koertel

Täiskasvanud **paelussid** ei põhjusta tavaliselt koerte ja kasside kliinilist haigestumist. Küll aga võivad *Dipylidium caninum*'i lülid liikuda aktiivselt pärakust välja ja põhjustada sügelusest tingitud „tagumikul kelgutamist”. Põistang-paeluss (*Echinococcus granulosus*) ja alveokokk-paeluss (*Echinococcus multilocularis*) põhjustavad ka inimestel haigust nimega ehhinokokoos. Eluvõimelised vastsed elavad maksas, kopsudes, ajus või neerudes paiknevates ehhinokokipõites ja võivad põhjustada tõsiseid kliinilisi sümptomeid ning isegi surma.


Ümarusside nakkust esineb sagedamini kutsikatel ja kassipoegadel. Raskemate juhtumite korral võib esineda punnis kõhtu, küünelaki - eemaldaja-sarnast hingeõhku, värisemist ja isegi krampihoogusid. Inimestel, kui vaheperemeestel, võivad parasiidi rändavad vastsed põhjustada ravile allumatut köha, nägemispuudulikkust ja isegi pimedaks jäämist.

Tõsise haigestumise korral võib lemmikutel esineda oksendamist ja kõhulahtisust või isegi kehvvveresust. Inimestel võivad nakatumisvõimelised vastsed läbi naha tungimisel põhjustada naha punetust ja sügelust.

Kidaussid ei ole inimestele ohtlikud, aga sagedase koera parasiidina põhjustavad nad koertel kaalukaadu ja vahelduva iseloomuga kõhulahtisust.



Paelussid sooles*



Ümarussid sooles*

* Pildid: Dep. of Parasitology, Centr. Vet. Inst., Budapest, Hungary

Soovitused inimese tervise kaitseks

- Inimesed nakatuvad nakatamisvõimeliste parasiidi vormidega tavaliselt suukaudselt, harvem läbi naha.
- Lemmiku hellitamise järgselt peske hoolega käsi.
- Peske hoolikalt tooreid marju ja köögivilju. Ärge sööge pesemata metsamarju, sest need võivad olla saastunud rebaste, hulkuvate koerte või kasside roojaga.
- Ärge jooge ega laske oma lemmikul juua looduslikest allikatest, jõgedest või tiikidest.
- Ärge lubage oma lastel mängida või joosta paljajalu roojaga saastunud piirkondades.
- Katke alati liivakast peale mängimist ohutult kinni.
- Nakkusohtliku materjali tuppa kandumise vältimiseks, jätke alati oma välisjalanõud ukse juurde.
- Juhul kui Teil või Teie pereliikmel ilmneb mõni terviseprobleem, andke perearstile teada, et Teil on kodus lemmikloom.



Kas teadsid?

- Parasiidimunad ja – vastsed on paljale silmale nähtamatud. Rooja mikroskoopilise uurimise käigus võib selguda, et Teie lemmik on parasiitidega nakatunud.
- Koerad võivad nakatuda parasiidimunade või -vastsetega suukaudselt, haiguskandjate (hiirte, kirpude, lindude, toore liha) söömisel, lootena emahus, emapiima imemisel või naha kaudu.
- Toores sea-või veiseliha ja sisikond võivad samuti olla nakkusallikaks.
- Kirbud on *Dipylidium caninum*-nimelise paelussi peremees-organismiks ning seetõttu on soovituslik kasutada regulaarselt kirbutorje vahendeid.
- Ei ole olemas kõikide parasiitide vastast ravimit, mis hoiaks ära eelseisvat nakatumist.
- Rooja koristamine ja regulaarne kuutide ning koera jooksualade puhastamine ja desinfitseerimine on väga oluline, sest ka ebaküpsed parasiidivormid on väljaspool organismi eluvõimelised.