

KAITSE OMA KOERA JUBA ENNE HAMMUSTAMIST!



Puugid



Kirbud



Pistesääsed



Moskiitod



Te võite teha mida tahes ja minna kuhu tahes...

**ENNETA VÄLISPARASIITE
JA NENDE KAUDU
LEVIVAIK HAIGUSI!**

Puugid, kirbud ja sääsed on peamised lüljalgsed välisparasiidid, kes siirutavad erinevaid bakteriaalseid, parasitaarseid kui ka viiruslikke nakkushaigusi koertele. **Eestis on põhilised siirutajad puugid ja kirbud.**

Tavaliselt saavad meie lemmikloomad puuke ja kirpe väliskeskkonnast. Võimalik on ka välisparasiitide liikumine loomalt loomale või loomalt inimesele.



PUUGID

PUUKIDE POOLT EDASIKANTUD HAIGUSED:

Borrelioos – *Borrelia burgdorferi* spiroheedi põhjustatud nakkushaigus. Haigust levitavad nakatunud puugid, kes koeralt verd imedes viivad haigustekitajad süljega koera organismi. Nakkuse edasikandumine puugilt koerale algab 24–48 tundi peale seda kui puuk on alustanud toitumist. Peiteaeg nakatumisest kliiniliste tunnuste avaldumiseni võib ulatuda 2–5 kuuni. Mõnel koeral võib haigus kulgeda ilma kliiniliste tunnusteta. Haigustunnused on mittespetsiifilised: palavik, lange, liigete turse, vähenenud söögiisu, loidus ja lümfisõlmede suurenemine. Haigus kahjustab peamiselt liigeseid ja neerusid.

Babesioos (piroplasmaos) võib kulgeda eluohtliku haigusena, aga ka kliiniliste nähtudeta. Ainurakne parasiit põhjustab punaliblede lagunemist, mille tulemusena tekib aneemia ehk kehvvveresus. Babeesiad liiguvad verd imevalt puugilt koerale 24–48 tunni jooksul. Haigust iseloomustab jõuetus, isutus, kahvatus, silma sidekesta, igemete ja naha värvustumine kollaseks ning sageli võib märgata, et koera uriin on punane või pruun. Selliste kliiniliste sümptomite märkamisel peab kohe pöörduma loomakliinikusse.

Erlühhiios ja **anaplasmoos** on nakkushaigused, mida esineb sagedamini Euroopa lõunapoolsemates riikides, kuid kliimamuutuste ja lemmikloomade reisimise tõttu ei saa välistada haiguse esinemist ka Eestis. Mõlema haiguse ülekandumise aeg puugilt koerale sõltub haigustekitaja alaliigist ja haigust siirutavast puugiliigist. Uuringud on näidanud, et erlühhiioosi nakatumine võib toimuda juba 3–6 tundi peale puugi kinnitumist. Erlühhiios ja anaplasmoos kahjustavad peamiselt vererakke ning vereloomet. Sümptomid on väga sarnased borrelioosi omadega: palavik, liigete valulikkus, loidus, lümfisõlmede suurenemine, millele võivad lisanduda verevalumid nahal ja limaskestadel, ninaverejooks, mis on tingitud vereliistakute vähesusest põhjustatud verehüübimatusest.



KIRBUD

Sügelus ja kirbuallergia

Dipüldidioos (*Dipylidium caninum*) – koeraviigi põhjustatud paelusstõbi on Eestis levinumaid paelusstõbesid koertel. Seda soodustab karpude rohkus, sest kirbud on koeraviigi vaheperemehed. Koerad nakatuvad, kui hammustavad kirbud katki ja neelavad alla. Haigust iseloomustavad kõhnumine ja seedehäired, kergematel juhtudel võivad koerad olla mõnikord väliselt täiesti terved.



SÄÄSELISED

Dirofilarioos – südameusstõbi ja nahavorm. Südameusstõbe põhjustab ümaruss *Dirofilaria immitis*, kes satub koera vereringesse nakatunud sääskede vahendusel. Koera organismis liigub parasiit vereringe kaudu kopsuarteritesse ja paremasse südamekotta. Nakatunud koer on nakkusallikaks sääskedele ja seeläbi ka teistele koertele. Eestis ei ela dirofilarioosi levitavaid sääseliike, kuid kliima muutustega seoses ei saa välistada uute liikide sissetõnnet. Südameusstõbe sümptomid on mittespetsiifilised – kõha, hingeldamine ja väsimus. Nahavormi iseloomustavad nahale tekkivad moodustised, mille sees on väikesed ussid. Dirofilarioosi nahavormi on üksikjuhtumitena diagnoositud ka Eestis elavatel koertel.


Leišmanioos on krooniline haigus, mida iseloomustab kaalulangus, muutused nahas ja lümfisõlmedes.

Dirofilarioosi ja leišmanioosi nakkuse ülekandumine sääselt koerale toimub sama kiiresti kui sääseliste toitumine – umbes 4 minuti jooksul.

Välisparasiiditõrje on oluline Euroopas reisimisel!


Leišmanioosi ja dirofilarioosi esineb sagedamini Euroopa soojemates riikides. Nakatumise riski tõttu on soovitatav kasutada enne reisi sääselistele tõrjuva toimega välisparasiiditõrjevahendit ning sihtkohas hoida koeri öösi toas.

- Kirbud / puugid, levitavad *Babesia canis*, *Borrelia burgdorferi*, *Ehrlichia canis*
- Kirbud / puugid / moskiitod, levitavad *Dirofilaria immitis*
- Kirbud / puugid / moskiitod / pistesääsed, levitavad *Leishmania infantum*



Fiproniil

(fenüülpürasoolid)




Akaritsiidne ja insektitsiidne

Tekitab putukate/leсталiste kesknärvisüsteemi kontrollimatut aktiivsuse ja surma

Permetriin

(püretroidid)



Akaritsiidne/
insektitsiidne ja repellent

**Kiire putukate surm
ja efektiivne eemalepeletamine**



Kirbud



Puugid



Moskiitod



Pistesäased

REPELLENT – VÄLISPARASIITIDELE EEMALEPELETAV TOIME
INSEKTITSIIDNE – PUTUKATELE (KIRBUD/SÄÄSELISED) SURMAV TOIME
AKARITSIIDNE – LESTALISTELE (PUUGID) SURMAV TOIME

EFFITIX®
TÄPILAHUS

fiproniil / permetriin



Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu veterinaararstiga. Käsimüügiravim. Täiendav informatsioon on saadaval ravimi müügiloo hoidja esindusest: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee